

Midwintertelling 2026

In januari 2026 zijn op 10, 13, 14 en 17 januari* voor de dertiende keer de vogels in de polders rondom Wassenaar geteld in het kader van de jaarlijkse midwintertelling. Het onderzoeksgebied omvat Koninklijke Landgoederen De Horsten, inclusief de Raaphorsterpolder (RHP), de Papenwegse en Zuidwijkse Polder (PWP), het noordelijke deel van de Duivenvoordse-Veenzijdse Polder (DVP), de Oranjepolder bij Duivenvoorde, het Valkenburgse Meer (VBM) en delen van de Ommedijkse, Ruigelaanse en Zonneveldse Polder.



De winter verloopt tot nu toe buitengewoon zacht (Hellmanngetal 6,5), in lijn met de voorgaande jaren. Net als in 2024 trad er een duidelijke omslag op: na een warme december volgden vorst en sneeuwval in grote delen van het land. In de aanloop naar de telling stond er een matige wind (Bft 3–4), die draaide van zuidwest naar zuidoost en uiteindelijk noordoost.

De eerste telronde verliep koud, met een gemiddelde temperatuur onder nul ($-1,8\text{ }^{\circ}\text{C}$). Tijdens de overige dagen was het half tot geheel bewolkt en aanzienlijk zachter ($5,6\text{--}8,6\text{ }^{\circ}\text{C}$). De gemiddelde temperatuur over alle teldagen kwam uit op $4,8\text{ }^{\circ}\text{C}$, hoger dan in 2024 ($2,9\text{ }^{\circ}\text{C}$).

De sneeuw en vorst voorafgaand aan de telling zorgden voor een sterke concentratie van watervogels en steltlopers op open water en op de onbesneeuwde weilanden. Dit resulteerde in hogere aantallen in vergelijking met de tellingen van de afgelopen tien jaar.

* De bezoeken lagen verspreid over vier dagen. Om dubbeltellingen door verplaatsingen te voorkomen, zijn op die dagen aanvullende bezoeken gebracht aan de overige gebieden. Voor aangrenzende deelgebieden is voor enkele soorten alleen het hoogste aantal van één van die deelgebieden genoteerd en niet het totaal van die deelgebieden samen. Idealiter zou het hele gebied een keer simultaan door vijf waarnemers geteld moeten worden, om onder- of dubbeltelling te voorkomen en het zuidelijke deel van de DVP mee te nemen.

Het weer van: zaterdag 10 januari 2026 in Voorschoten**Temperatuur**

Gemiddelde	-1.8 °C
Maximum	-1.1 °C
Minimum	-2.5 °C

Zon, bewolking en zicht

Duur zonneschijn	0.7 uur
Rel. zonneschijnduur	9 %
Bedekkingsgraad	8 octa's
	Geheel bewolkt
Minimaal zicht	14 km

Relatieve luchtvochtigheid

Gemiddelde	76 %
------------	------

Neerslag

Hoeveelheid	<0.05 mm
Duur	0.0 uur

Wind

Gemiddelde snelheid	4.7 m/s
Maximale uurgemiddelde snelheid	7.0 m/s
Maximale stoot	10.0 m/s
Overheersende windrichting	54 °

Luchtdruk

Gemiddelde luchtdruk	1012.5 hPa
----------------------	------------

bron: www.knmi.nl**Het weer van: dinsdag 13 januari 2026 in Voorschoten****Temperatuur**

Gemiddelde	8.6 °C
Maximum	9.7 °C
Minimum	6.8 °C

Zon, bewolking en zicht

Duur zonneschijn	0.0 uur
Rel. zonneschijnduur	0 %
Bedekkingsgraad	8 octa's
	Geheel bewolkt
Minimaal zicht	1.7 km

Relatieve luchtvochtigheid

Gemiddelde	96 %
------------	------

Neerslag

Hoeveelheid	6.1 mm
Duur	8.4 uur

Wind

Gemiddelde snelheid	4.2 m/s
Maximale uurgemiddelde snelheid	5.0 m/s
Maximale stoot	9.0 m/s
Overheersende windrichting	199 °

Luchtdruk

Gemiddelde luchtdruk	1006.9 hPa
----------------------	------------

bron: www.knmi.nl**Het weer van: woensdag 14 januari 2026 in Voorschoten****Temperatuur**

Gemiddelde	5.6 °C
Maximum	8.9 °C
Minimum	0.6 °C

Zon, bewolking en zicht

Duur zonneschijn	6.7 uur
Rel. zonneschijnduur	82 %
Bedekkingsgraad	5 octa's
	Bewolkt
Minimaal zicht	0.5 km

Relatieve luchtvochtigheid

Gemiddelde	94 %
------------	------

Neerslag

Hoeveelheid	1.3 mm
Duur	2.5 uur

Wind

Gemiddelde snelheid	2.3 m/s
Maximale uurgemiddelde snelheid	6.0 m/s
Maximale stoot	9.0 m/s
Overheersende windrichting	252 °

Luchtdruk

Gemiddelde luchtdruk	1011.9 hPa
----------------------	------------

bron: www.knmi.nl

Het weer van: zaterdag 17 januari 2026 in Voorschoten			
Temperatuur		Neerslag	
Gemiddelde	6.9 °C	Hoeveelheid	1.7 mm
Maximum	11.6 °C	Duur	2.5 uur
Minimum	1.8 °C		
Zon, bewolking en zicht		Wind	
Duur zonneshijn	5.8 uur	Gemiddelde snelheid	2.5 m/s
Rel. zonneshijnduur	70 %	Maximale uurgemiddelde snelheid	4.0 m/s
Bedekkingsgraad	8 octa's	Maximale stoot	7.0 m/s
	Geheel bewolkt	Overheersende windrichting	122 °
Minimaal zicht	0.5 km	Luchtdruk	
		Gemiddelde luchtdruk	1017.9 hPa
Relatieve luchtvochtigheid			
Gemiddelde	95 %		

bron: www.knmi.nl

Samenvatting

In 2026 werd een recordaantal van 13.907 vogels geteld, maar liefst 177% boven het langjarig gemiddelde. Veel soorten lieten hoge aantallen zien, vaak de hoogste sinds de start van de tellingen in 2005.

- **27 soorten** scoorden ruim boven het langjarig gemiddelde (>25%).
- **8 soorten** lieten een lichte groei zien (<25%).
- **4 soorten** gingen licht achteruit.
- **5 soorten** zaten diep in de min (–25% of meer).

Enkele hoogte- en dieptepunten:

- **Grauwe Gans** (+155%), **Canadese Gans** (+283%), **Nijlgans** (+228%) en **Wintertaling** (+219%) bereikten hun hoogste aantallen sinds 2005.
- **Meerkoet** (+39,3%), **Waterhoen** (+42,4%) en **Waterral** (+772,7%) waren opvallend talrijk.
- **Rotgans**, **Zilverplevier**, **Boomleeuwerik** en **Zwarte Mees** werden voor het eerst tijdens een midwintertelling waargenomen.
- **Goudplevier** (–72%), **Zilvermeeuw** (–53%) en **Boomklever** (–69%) waren de belangrijkste negatieve uitschieters.
- **Wilde Zwaan**, **Scholekster** en **Keep** ontbraken geheel.

Top-Tien 2005 en 2026

Soort	2005	Soort	2026
Smient	1,632	Smient	2,314
Houtduif	1,295	Kolgans	2,105
Meerkoet	1,262	Grauwe Gans	1,740
Stormmeeuw	680	Meerkoet	1,352
Wilde Eend	550	Kievit	1,102
Krakeend	466	Stormmeeuw	740
Kokmeeuw	349	Nijlgans	546
Kievit	313	Wilde Eend	456
Wintertaling	258	Krakeend	412
Kuifeend	236	Grote Canadese Gans	410
Totaal top-10	7,041	Totaal top-10	11,177


Zes soorten stonden zowel in 2005 als in 2026 in de top 10 van meest getelde soorten. Opvallend is dat **Kolgans**, **Grauwe Gans**, **Nijlgans** en **Grote Canadese Gans** inmiddels een plek in de top 10 hebben veroverd, ten koste van **Kuifeend**, **Houtduif** en **Kokmeeuw**. Van deze drie laat volgens SOVON alleen de Houtduif in Zuid-Holland tussen 2012 en 2024 een matige afname zien; de trends voor Kuifeend en Kokmeeuw binnen het Meetnet Watervogels waren in die periode stabiel. De **Wintertaling** bereikte dit jaar in de polders rond Wassenaar met 407 exemplaren een recordaantal, maar moest desondanks de ganzen in de top 10 voor zich dulden. In Zuid-Holland is de trend voor de Wintertaling sinds 2012 stabiel, terwijl landelijk juist een toename is geconstateerd.

Soortenoverzicht

De **Grauwe Gans** vestigde een ongeëvenaard record met 1.740 exemplaren. Het merendeel verbleef op of rond de maïsakker in de Raaphorsterpolder. Het gemiddelde over de jaren 2005-2024 bedroeg 683 exemplaren. Het hoogste aantal in die periode werd in 2016 vastgesteld (1.122), het laagste in 2019 (404).

In de beginjaren van de telling (2005-2007) was de soort veel minder talrijk, met gemiddeld 108 exemplaren. Het winterbestand zal op dit moment meer dan 2.500 bedragen, maar is afhankelijk van weersomstandigheden en verstoring.

Waarnemingen van vogels met een halsband bevestigen het vermoeden dat een deel van de overwinterende populatie bestaat uit lokale vogels die de Starrevaart als rustgebied gebruiken.



Grauwe Gans "HJ75" - Raaphorsterpolder - 9 januari 2026

Sinds 2010 overwinteren er groepen **Kolganzen** in het gebied. Dit seizoen kende de soort een moeizame start: in de laatste maanden van 2025 werden slechts bescheiden aantallen gezien (maximaal 466). Ook Adri Remeus (AR) noteerde lagere aantallen: "Op 3 december telde ik er 586 en op 21 december 572, in de Duivenvoordse Polder. Inderdaad erg mager als je bedenkt dat ik gewend ben aan aantallen tussen 1.200 en 1.700, incidenteel zelfs boven de 2.000."

Tijdens de midwintertelling vond er een opmerkelijke ommezwaai plaats met in totaal 2.105 Kolganzen, waarvan 1.951 in de DVP.

Op 20 januari telde AR zelfs een recordaantal van 3.026 exemplaren in de DVP en RHP.



Kolganzen - DVP - 10 januari 2026

De **Rotgans** werd voor de zevende keer in De Horsten aangetroffen, maar dit was de eerste keer tijdens een midwintertelling. De overige waarnemingen vielen in april (2×), oktober (3×) en november (1×).

Net als voorgaande jaren zaten er ook nu weer **Kleine Rietganzen** in het gebied. Eén exemplaar werd opgemerkt tussen de Kolganzen ten noorden van de Duivenvoordse Weg. De soort neemt als wintergast in Nederland sterk af en overwintert tegenwoordig vooral in Denemarken.



Kleine Rietgans - Raaphorsterpolder - 23 januari 2026

Tellingen uit drie polders brachten 375 **Brandganzen** aan het licht, dicht bij het langjarig gemiddelde van 424. De aantallen liggen de laatste vier jaar wel structureel lager dan in de periode 2016–2021, toen er gemiddeld 772 vogels overwinterden. Buiten de telling om werden op 17 januari bij het VBM 851 Brandganzen geteld.

Het aantal van 94 **Knobbelzwanen** past in het beeld van de laatste jaren. Het gemiddelde over 2020–2024 ligt met 96 exemplaren net iets hoger.

Het zwaartepunt van de verspreiding van de **Krakeend** ligt tegenwoordig in de Papenwegse en Zuidwijkse Polder, waar 214 exemplaren aanwezig waren. De Vijver in de Raaphorst, in het verleden altijd een belangrijke overwinteringsplek, leverde dit jaar een schamele 20 vogels op. Het VBM was goed voor 149 exemplaren. Het stevige record van 2024 (763) werd niet benaderd, maar een totaal van 412 Krakeenden is nog steeds een respectabel aantal en blijft ruim boven het langjarig gemiddelde (338).

Net als bij de Kolgans lagen de aantallen **Smienten** in de voorafgaande maanden op een laag niveau. In De Horsten en de DVP werden maximaal 288 vogels gezien. Tijdens de midwintertelling konden echter de gebruikelijke aantallen worden genoteerd. In de Veenwatering bij de Duivenvoordse Weg zat een groep van 652 exemplaren; in de PWP werden bij de Veenwatering en Dobbewatering 463 Smienten geteld. De grootste groep bevond zich op het Valkenburgse Meer. Ondanks de “gemotoriseerde” vissers die tijdens de telling het hele meer rondvoeren, konden er 1.180 vogels worden opgeschreven.



492 Smient, 26 Wintertaling, 2 Krakeend, 1 Fuut en 8 Aalscholvers - DVP - 10 januari 2026

In totaal werden 2.314 Smienten geteld. Alleen in 2006 (2.356) en 2018 (2.751) waren er meer aanwezig. Wel moet worden opgemerkt dat in het verdere verleden de aantallen bij deze weersomstandigheden veel hoger lagen. Dan verbleven er op het Valkenburgse Meer vaak tussen de 2.000-3.000 vogels en bij echt barre omstandigheden tussen de 5.000-7.500 Smienten.

De **Wilde Eend** bleef tijdens de tellingen van 2021-2024 op een constant niveau. De aantallen schommelden tussen de 501 en 545 exemplaren. Dit jaar zaten er 456 in het hele gebied, wat verbazingwekkend genoeg exact gelijk is aan het langjarig gemiddelde.

Op het VBM verbleef de enige man **Pijlstaart**. Buiten de telperiode werd op 17 januari een vrouwtje gezien op de Vijver in De Horsten. Een bezoek aan het VBM werd beloond met drie mannetjes en een vrouwtje Pijlstaart (23 januari 2026).

Er werden maar liefst 407 **Wintertalingen** gezien (langjarig gemiddelde 128). Tijdens vorstperiodes zoekt de soort vaste plekken op, zoals de Vijver in de Raaphorst, waar op 10 januari 266 exemplaren aanwezig waren. Nog nooit waren daar zoveel Wintertalingen present. Bij de Smienten in de Veenwatering bij de Duivenvoordse Weg werden 33 vogels geteld; de Veenwatering in de PWP herbergde er 103.

De **Slobeend** verbrak het record uit 2024 en vestigde met 24 exemplaren een nieuw hoogtepunt. De vogels werd verspreid over alle polders aangetroffen.

Dit jaar verbleven er 158 **Kuifeenden** in het gebied, iets meer dan in 2024 (153) en het langjarig gemiddelde (151). De grootste groep lag op het VBM (114), de Vijver in de Raaphorst was goed voor 40 exemplaren (evenveel als in 2024) en in de PWP zaten vier Kuifeenden.

Dodaars (15) en **Fuut** (30) werden gezien op het Valkenburgse Meer, de Zijlwatering, de Vijver in de Raaphorst en in de Veenwatering. Het was voor het eerst sinds de startjaren 2005 (20) en 2006 (18) dat er weer 15 of meer Dodaarzen konden worden genoteerd. Het langjarig gemiddelde komt niet verder dan 9. Het hoogste aantal **Futen** werd in 2006 vastgesteld (41).

Er werden 26 **Grote Zilverreigers** opgemerkt (gemiddelde 2016-2024: 17 en als hoogste aantal 28 in 2021). De **Blaauwe Reiger** deed daar een schepje bovenop: 35 exemplaren (gemiddelde 2016-2024: 32).

Erg leuk was de **Kleine Zilverreiger** die zich liet bewonderen bij de ingang van Ter Horst in het gezelschap van een Grote Zilverreiger. Het was de eerste waarneming van deze soort in het gebied sinds 2006.



Kleine Zilverreiger - Ter Horst - 17 januari 2026

Na de primeur in 2024 kon ook dit jaar de **Lepelaar** op de soortenlijst worden bijgeschreven: er verbleven niet minder dan 6 Lepelaars in de polders (3 in de PWP, 1 in de RHP en 2 in de DVP). Op 30 december had AR al een Lepelaar in De Horsten, waardoor er nu uit alle maanden van het jaar waarnemingen bekend zijn.

De zeven **Sperwers** vormden een mooi aantal voor deze regio. Tijdens de januaritelling in de Wassenaarse duinen werden door vogelwerkgroep Meijendel eveneens zeven vogels gezien, waarmee beide gebieden boven het langjarig gemiddelde scoorden.

Bij Eikenhorst verscheen de enige **Havik** van deze telling, met als toegift een baltsvlucht rond de voormalige boerderij van Van Wissen.


Net als in 2021 werd er weer een **Blaauwe Kiekendief** waargenomen. In de Raaphorsterpolder vloog een adulte vrouw laag over de weilanden op zoek naar prooi. De vogel bekommerde zich in het geheel niet om de groep opschrikkende Graspiepers en Watersnippen.

De **Buizerd** was met 14 vogels aanwezig, iets onder het gemiddelde van 16. De laagste aantallen waren 8 in 2016 en 9 in 2024; het maximum van 27 werd in 2022 genoteerd.

In De Horsten werden op twee locaties **Waterrallen** gehoord. Het VBM huisvestte minimaal zes exemplaren; vier daarvan begonnen tegelijkertijd te alarmeren vanwege een opvliegende Houtsnip.

Het **Waterhoen** was met 91 vogels goed vertegenwoordigd: iets lager dan in 2024 (98), maar ruim boven het langjarig gemiddelde (63).

De laatste 3 jaar lag het aantal **Meerkoet** rond de 1.000 vogels. Dit jaar ging het om 1.352 exemplaren. Een mooie top-3 notering, alleen in 2006 (1.357) en 2007 (1.407) werden hogere aantallen geteld. Leuk was de eerste waarneming van een “Frank Majoor”-vogel in De Horsten met ring KCR in een groep overwinterende Meerkoeten langs de Veenwatering. Helaas was de vogel niet geringd op de local patch in het Sarphatipark, maar aan het Pinksterbloemplein in De Haag op 3 maart 2023, hemelsbreed een afstand van ongeveer 12.7 kilometer. Dit is de eerste terugmelding van deze vogel.



Meerkoeten inclusief “KCR” - DVP - 23 januari 2026

Door de vorst en sneeuwval verschenen er eindelijk weer behoorlijke aantallen steltlopers in het gebied. De **Kievit** was met 978 exemplaren talrijker dan in de afgelopen tien jaar. Hopelijk de start van een voorzichtig herstel in de regio. Het maximum van 1.690 exemplaren dateert uit 2007. Tot 15 jaar geleden overwinterden er bij het VBM overigens regelmatig meer dan 2.000 Kieviten.

Tussen de Kieviten werden 13 **Goudplevieren** ontdekt.

Voor het eerst tijdens een officiële midwintertelling werd een **Zilverplevier** in het noordelijke deel van de PWP gezien. Net als de Goudplevieren bevond de vogel zich een groep Kieviten. Dit was pas de tweede winterwaarneming sinds 1996, toen er twee exemplaren werden gemeld.

De **Wulp** was bijna terug op het niveau van de jaren '90 en '00, toen er geregeld tientallen vogels overwinterden in de polders tussen Leiden en Den Haag. In de DVP zat een groep van 32 Wulpen, de PWP was goed voor 20 exemplaren en vijf vogels foerageerden in de Ommedijkse Polder. In totaal leverde dit 57 Wulpen op.

Hout- en **Watersnip** volgden het vertrouwde patroon bij vorst en sneeuwval. Dergelijke weersomstandigheden zorgen altijd voor een influx vanuit het noorden en oosten. Er werden 79 **Watersnippen** geteld. Een groot deel daarvan (55) werd in de Raaphorsterpolder opgeschrikt door een jagende Blauwe Kiekendief, die werd achtervolgd door een Torenvalk.



Watersnip - Raaphorsterpolder - 10 januari 2026

Vijf **Houtsnippen** vlogen op vanuit de begroeiing langs het Valkenburgse Meer tijdens het tellen van de Smienten. Ook in de PWP en op Ter Horst werd een Houtsnip gezien.

Bij de januaritelling in Meijndel (1.000 hectare) werden 111 Houtsnippen en 21 Watersnippen opgemerkt (bron: VWG Meijndel [winter 2025.pdf](#)), wat een indicatie zou kunnen zijn voor nog hogere aantallen in de landgoederenzone van Wassenaar.

Bij het Molenpad in de RHP dook bovendien een **Witgat** op, de vierde waarneming in 13 jaar midwintertellingen.

De onbesneeuwde weilanden trokken grote aantallen **Stormmeeuwen** aan. Het sneeuwdek in het binnenland lijkt voor de vogels aanleiding te zijn geweest om massaal naar de kustprovincies uit te wijken. Het maximum van 948 uit 2006 werd niet gehaald, maar met 740 exemplaren werd een keurige tweede plek bereikt. Toch verbleekt dit bij een waarneming uit de oude doos: op 5 januari 1980 telde AR 1.910 Stormmeeuwen in De Horsten.

De **Kokmeeuw** herstelde zich na het dieptepunt van 2024 (52 exemplaren) en kwam met 213 vogels weer dicht bij het langjarig gemiddelde (217).

De **Zilvermeeuw** kende een lichte opleving ten opzichte van 2024 (7), maar bleef met 45 exemplaren ver onder het langjarig gemiddelde (96).

Net als in 2016 en 2024 werd één **Kleine Mantelmeeuw** op het VBM gezien.

De **Veldleeuwerik** beleefde met 38 exemplaren de meest succesvolle telling ooit (vorig maximum: 10 in 2006). Dit is sinds 2016 pas de tweede waarneming, destijds betrof het één exemplaar. Tegenwoordig wordt de Veldleeuwerik in de winter vrijwel alleen bij sneeuwval aan de grond gezien. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen ze op bollenvelden in de buurt overwinterden.

Een **Boomleeuwerik** scharrelde rond op een braakliggend terrein bij het Valkenburgse Meer. Dit is pas de eerste keer dat de soort opduikt tijdens een midwintertelling.

In het verleden was het Valkenburgse Meer de enige locatie waar tijdens de midwintertelling **Cetti's Zangers** werden opgespoord. De soort kent de laatste 12 jaar een significante toename (>5% per jaar) in Nederland. De populatie is in korte tijd gegroeid naar 5.300-6.300 broedvogels in 2023. Deze ontwikkeling gaat niet geruisloos voorbij aan dit gebied. In de Horsten bevond zich in ieder geval 1 vaste zangpost van de Cetti's Zanger. In de oeverbegroeiing van het VBM en in de ruigte/tankgracht bij het voormalige vliegveld Valkenburg huisden zeven Cetti's Zangers.

Teleurstellend waren de lage aantallen voor **Vink** (64 exemplaren) en **Sijs** (35 exemplaren). De **Keep** werd helemaal niet gezien (2024: 34 exemplaren).



Grote Gele Kwikstaart - boerderij Van der Ham (Zuidwijk) - 14 januari 2026

Daartegenover stonden aardige aantallen van **Graspiepers** (50) en was minstens één **Waterpieper** aanwezig in de polders.

Overige opmerkelijke waarnemingen tijdens deze midwintertelling waren 6 **IJsvogels**, 2 **Groene Spechten**, 2 **Raven**, 2 **Grote Gele Kwikstaarten** en 3 **Witte Kwikstaarten**.

De **Zwarte Mees** was echter de onbetwistbare verrassing van de telling. Op de terugweg van de Papenwegse en Zuidwijkse Polder was een zacht roepje voldoende was om de remmen dicht te knijpen. En niet voor niets: een adembenemende Zwarte Mees liet zich van dichtbij bewonderen en had de primeur om in het overzicht te worden opgenomen.

Buiten de reguliere wintertellingen om waren er nog enkele waarnemingen die het vermelden waard zijn. Deze zijn niet in het totaaloverzicht opgenomen.

Op 17 januari dobberden 2 mannetjes **Tafeleend** en 5 **Bergeenden** op het Valkenburgse Meer. In de rietkraag aan de zuidzijde van het meer zat een mannetje **Roodborsttapuit**. Ook in de RHP overwinterde in elk geval een mannetje Roodborsttapuit (1 februari).

Twee **Kleine Rietganzen** en de eerste **Kepen** van 2026 bevonden zich op 22 januari in de Oostdorper- & Huis ter Weerpolder.

Op 9 februari verbleven twaalf **Toendrarietganzen** in de PWP.

De “vaste” groep **Wilde Zwanen** arriveerde pas op 28 december 2025 in het gebied, maar liet na 1 januari verstek gaan, mogelijk door vuurwerkverstoring. Vanaf 1 februari waren ze weer te zien in de Ruigelaanse en Zonneveldse Polder (bron: <https://denhaag.waarneming.nl/>).



Bonte Kraai - Molenpad RHP - 21 november 2025

De **Bonte Kraai** die op 7 november 2025 werd ontdekt bij het Molenpad, in een grote groep **Zwarte Kraaien**, bracht het merendeel van zijn tijd door op het strand bij Berkheide en bij de vuilstort langs de Ruigelaanse- en Zonneveldse Polder. Hierbij werden de bekende foerageerroutes van de Zwarte Kraaien gevolgd. De vogel bleef in elk geval tot 25 februari aanwezig.

Bijlage 1 Hellmanngetal midwintertellingen 2005 - 2026

Jaar	gem. temperatuur tellingen	Hellmanngetal*	Classificatie
2005	1.6 °C	5.3	buitengewoon zacht
2006	0.7 °C	6.0	buitengewoon zacht
2007	9.4 °C		buitengewoon zacht
2008	-1.0 °C	16.1	zeer zacht
2009		36.8	zacht
2010		37.2	zacht
2011		51.1	mild
2012			buitengewoon zacht
2013		30.7	zacht
2014			buitengewoon zacht
2015		0.4	buitengewoon zacht
2016		3.6	buitengewoon zacht
2017	1.2 °C	15.9	zeer zacht
2018	5.4 °C	0.3	buitengewoon zacht
2019	6.5 °C	3.3	buitengewoon zacht
2020	6.7 °C		buitengewoon zacht
2021	1.1 °C		buitengewoon zacht
2022	3.7 °C	5.3	buitengewoon zacht
2023	8.6 °C	14.6	zeer zacht
2024	2.9 °C	7.1	buitengewoon zacht
2025		1.2	buitengewoon zacht
2026	4.8 °C	6.5	buitengewoon zacht

*Hellmanngetal is de cumulatieve waarden van alle etmaalgemiddelde, waarbij de gemiddelde temperatuur de gehele dag beneden het vriespunt blijft in het tijdvak vanaf 1 november van het voorgaande jaar tot en met 31 maart van het betreffende jaar met weglating van het minteken.

Voor dit overzicht is voor ieder jaar de data van weerstation Valkenburg ZH/Voorschoten gebruikt voor de periode 1 november - 20 januari.

Koudegetal Hellmann (H)	Classificatie
H > 300	Streng
H > 160	Zeer koud
H > 100	Koud
H < 100	Mild
H < 40	Zacht
H < 20	Zeer Zacht
H < 10	Buitengewoon zacht

Bijlage 2 overzicht midwintertellingen 2026 versus gemiddelde aantal 2005-2024

Δ	Soort	2026	2024	2023	2022	# jaren aanwezig	max. # 2005-2026	gem. 2005-2024	% 2026 vs 2005-2024*
	Indische Gans	0	1	0	0	2	1	0.2	
	Toendrarietgans	0	0	0	0	2	5	0.6	
	Kleine Rietgans	1	2	3	0	4	3	0.7	
↑	Grauwe Gans	1,740	937	1,077	907	13	1740	683.2	255%
↑	Kolgans	2,105	2,830	1,911	525	13	2830	879.7	239%
↑	Grote Canadese Gans	410	395	194	114	12	410	107.2	383%
	Rotgans	1	0	0	0	1	1	0.0	
↓	Brandgans	375	169	157	17	12	1052	423.6	89%
	Mandarijneend	0	6	0	0	3	7	1.7	
	Carolina-eend	0	2	0	0	1	2	0.2	
↑	Knobbelzwaan	94	106	66	95	13	146	91.6	103%
↓	Wilde Zwaan	0	9	0	0	6	27	7.0	0%
	Kleine Zwaan	0	19	0	0	4	19	4.4	
	Zwarte Zwaan	2	1	0	0	2	2	0.1	
↑	Nijlgans	546	221	215	163	13	596	166.7	328%
↓	Bergeend	0	13	5	0	7	13	2.7	0%
↑	Krakeend	412	763	238	379	13	763	337.8	122%
↑	Smient	2,314	1,632	880	975	13	2751	1,508.0	153%
	Wilde Eend	456	527	545	515	13	550	456.4	100%
↑	Slobeend	24	23	10	10	12	24	9.5	253%
↓	Pijlstaart	1	0	1	0	9	7	1.7	60%
↑	Wintertaling	407	157	111	189	13	407	127.5	319%
	Tafeleend	0	7	0	0	3	8	1.5	
↑	Kuifeend	158	153	98	102	13	390	151.0	105%
	Grote Zaagbek	0	1	0	0	1	1	0.1	
↑	Dodaars	15	8	6	8	13	20	9.1	165%
	Kuifduiker	0	0	0	1	1	1	0.1	
	Roodhalsfuut	0	0	0	0	1	1	0.1	
↑	Fuut	30	26	30	27	13	41	25.3	119%
↑	Ooievaar	7	9	2	2	8	9	1.8	400%
↑	Blauwe Reiger	35	26	29	42	13	45	32.2	109%
↑	Grote Zilverreiger	26	21	20	25	12	28	16.7	156%
	Kleine Zilverreiger	1	0	0	0	2	1	0.1	
↑	Aalscholver	62	62	67	56	13	103	52.4	118%
	Lepelaar	6	4	0	0	2	6	0.3	
	Zeearend	0	0	0	0	1	1	0.1	
↑	Sperwer	7	1	2	1	10	7	1.1	646%
↑	Havik	1	2	2	3	7	3	1.0	100%
	Blauwe Kiekendief	1	0	0	0	2	3	0.3	
↓	Buizerd	14	9	15	27	13	28	16.3	86%
↓	Torenvalk	3	6	5	5	13	9	4.6	65%
↑	Slechtvalk	2	1	2	2	12	4	1.8	109%
↑	Waterral	8	2	1	2	9	8	0.9	873%
↑	Waterhoen	91	98	101	104	13	145	63.9	142%
↑	Meerkoet	1,352	1,099	937	1,030	13	1407	970.8	139%

Δ	Soort	2026	2024	2023	2022	# jaren aanwezig	max. # 2005-2026	gem. 2005-2024	% 2026 vs 2005-2024*
↓	Scholekster	0	0	1	3	7	54	10.0	0%
↑	Kievit	978	555	65	317	13	1690	456.4	214%
	Zilverplevier	1	0	0	0	1	1	0.0	
↓	Goudplevier	13	1	0	0	7	335	46.5	28%
	Kemphaan	0	0	0	0	1	1	0.1	
	Houtsnip	7	2	0	0	2	7	0.2	
↑	Watersnip	79	1	0	4	7	79	3.7	2155%
↑	Wulp	57	2	1	1	8	88	12.8	444%
	Zwarte Ruiter	0	0	0	0	1	1	0.1	
	Tureluur	0	0	0	0	3	4	0.7	
	Witgat	1	0	0	1	4	1	0.3	
↓	Kokmeeuw	213	52	73	172	13	712	216.6	98%
↑	Stormmeeuw	740	290	105	177	13	948	391.4	189%
↓	Grote Mantelmeeuw	0	0	1	0	6	5	0.9	0%
↓	Zilvermeeuw	45	7	68	46	13	312	96.1	47%
	Kleine Mantelmeeuw	1	1	0	0	3	1	0.2	
↑	Holenduif	150	45	63	59	13	150	51.3	292%
↑	Houtduif	360	95	532	124	13	1295	348.9	103%
↑	IJsvogel	6	4	6	0	11	10	3.3	180%
	Kleine Bonte Specht	0	0	0	0	1	1	0.1	
↑	Groene Specht	2	1	0	0	6	2	0.5	400%
	Roek	0	0	0	0	1	1	0.1	
↑	Raaf	2	0	0	1	7	3	0.8	240%
	Zwarte Mees	1	0	0	0	1	1	0.0	
	Kuifmees	0	0	0	0	1	1	0.1	
	Boomleeuwerik	1	0	0	0	1	1	0.0	
	Veldleeuwerik	38	0	0	0	4	38	1.1	
↑	Cetti's Zanger	8	2	2	1	7	8	0.8	960%
↓	Tjiftjaf	0	2	1	1	5	2	0.5	0%
↓	Vuurgoudhaan	2	4	10	8	9	10	2.4	83%
↓	Boomklever	4	16	11	20	13	23	12.8	31%
	Grote Lijster	0	0	0	0	1	1	0.1	
	Ringmus	0	0	0	0	3	2	0.3	
↑	Grote Gele Kwikstaart	2	1	1	4	10	4	1.4	141%
	Witte Kwikstaart	3	0	0	1	4	8	0.9	
↑	Graspieper	50	3	41	5	13	63	24.6	203%
↑	Waterpieper	1	0	0	1	5	1	0.3	300%
	Appelvink	0	2	0	0	1	2	0.2	
	Goudvink	0	0	0	0	2	4	0.7	
	Geelgors	0	0	0	0	1	2	0.2	
↑	Rietgors	3	0	0	1	8	5	1.2	257%
	Sneeuwgors	0	0	0	0	1	1	0.1	
↑	Totaal	13,907	10,434	7,711	6,273			7,850.0	177%

* Indexcijfer alleen berekend voor die soorten die >4 jaar vertegenwoordigd zijn. ↑ toename van >25% ↑ toename tussen 0 en 25% ↓ afname tussen 0 en 25% ↓ afname van >25%